

Ethnobotanique, écologie et conservation de *Borassus aethiopum* au Bénin: dans la zone soudano-guinéenne (Bénin) PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

La présente recherche a pour but de contribuer à la valorisation et la conservation du rônier au Bénin. Les données ont été collectées à l'aide des questionnaires d'enquêtes ethnobotaniques et socioéconomiques et des relevés floristiques au moyen de l'approche de choix raisonné et de l'installation de 70 placeaux. *Borassus aethiopum* est utilisée dans l'alimentation, la vannerie, la construction, la médecine traditionnelle. Les marges bénéficiaires réalisées varient entre 34 500 et 54 660 FCFA par an pour les producteurs et entre 125 014,08 FCFA et 493 571,04 FCFA par an pour les vendeurs d'hypocotyles. Par ailleurs, *B. aethiopum* est plus distribué dans le phytodistrict du Zou que dans ceux de Bassila et du Borgou Sud. Son habitat naturel est la savane et la galerie forestière. Par ailleurs, les caractères morphologiques et la productivité des rôniers varient d'une population de *B. aethiopum* à l'autre ($p < 0,001$). Les plus grandes hauteurs (> 10 m) sont ceux du district de Bassila. Les rôniers des galeries forestières produisent plus de fruits (59 504 fruits/ha) car ayant plus de pieds femelles (103,33) que de pieds mâles. On note une absence de conservation endogène de l'espèce.

3 déc. 2015 . Pour chacune des régions de l'étude, trois zones agro-écologiques sont .. (Zinder) // Bénin: 178 Le Testu // Nord-Nigéria : FHI 16151Keay (Zamfara) ; FHI ... Au Mali, on le rencontre du sahel à la zone soudano- guinéenne sur les sols .. sur financement U. E. Page 37 sur 202 *Borassus aethiopum* Mart.

sahéliennes vers les zones soudaniennes et soudano-guinéennes dans la cadre de la . pays, afin de faire des éleveurs des alliés de la conservation des ressources naturelles. .. Mots clés : Ecologie, *Raphia*, valeurs d'usages, Ethnobotanique, Bénin. .. de *Borassus aethiopum* dans les terroirs riverains de la Réserve.

Les palmiers sauvages du Bénin: utilisation, biodiversité, écologie, importance économique, et conservation, 2012. . Elephants-induced damage drives spatial isolation of the dioecious palm *Borassus aethiopum* Mart. .. des espèces introduites dans les galeries forestières en zone Soudano-Guinéenne au Bénin.

Institut de Recherche en Biologie et Ecologie Tropicale .. conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique. ... Sud-Ouest font partie de la zone soudano-guinéenne. .. de la Tapoa, à cheval entre le Niger, le Bénin et bien sûr le Burkina Faso, et le ... *Acacia albida*, *Adansonia digitata*, *Borassus aethiopum*,.

23 déc. 2015 . Ethnobotanique, écologie et conservation de *Borassus aethiopum* au Bénin. dans la zone soudano-guinéenne (Bénin). Presses Académiques.

méthodes floristique, phytosociologique, ethnobotanique et .. végétation de deux grandes zones agro-écologiques du Sénégal (les . conservation des espèces, leur utilisations, comme préalables à la gestion .. des composantes du parc en forme de W situé entre 3 pays (Bénin, Burkina .. *Borassus aethiopum* Mart.

résultats obtenus et disponibles dans les différentes zones agro-écologiques. . c/o ITTA 08 B.P. 0932 Cotonou, Benin .. matière de conservation et de domestication des espèces concernées. .. *Borassus aethiopum* Mart. .. *senegalensis* est très largement répandue dans les savanes soudano-guinéennes et s'étend du.

23 déc. 2015 . Ethnobotanique, écologie et conservation de *Borassus aethiopum* au Bénin: dans la zone soudano-guinéenne (Bénin). Front Cover.

18 juin 2001 . pratiques culturelles et la conservation de la biodiversité en Afrique>>

rassemblant les ... *Borassus aethiopum* (rônier) peuvent servir d'illustration pour comprendre .. Guide de terrain des ligneux sahéliens et soudano-guinéens. Ed. Agric. .. de l'Afrique, Afrique sahélo—soudanienne, Golfe du Bénin.

Figure 2 : Carte des zones agro-écologiques du Bénin. ... programmes d'aménagement participatif des forêts pour conserver et utiliser . biogéographiques (zones soudano-guinéenne et soudanienne) et à trois districts .. Par une enquête socio-économique, ethnobotanique et ethno-zoologique, .. *Borassus aethiopum*.

Dr. Satabié Benoît, Ethnobotaniste, Maître de Recherche, Ancien Chef de .. Elles se rencontrent en Afrique de la zone sahélo-soudanienne à la zone guinéenne. ... For a long time

this new species was mistaken for *Borassus aethiopum* Mart. .. Chorology of larger fungi in Benin with regard to vegetation types and.

Moyens financiers mobilisés pour la conservation de la diversité biologique ... l'absence quasi totale de savanes à rôniers (*Borassus aethiopum*). ... D'après Aké Assi (1984), la flore Soudano-Zambézienne du Nord comprend 1.377 .. sp. qui font l'objet d'élevage et d'investigation en Côte d'Ivoire au Ghana, au Bénin.

CONTRIBUTION A L'ETUDE ETHNOBOTANIQUE ET CARACTERISATION . mes remerciements au personnel du Laboratoire d'Ecologie Appliquée, M. Adi .. remarquables de *Adansonia digitata* et de *Borassus aethiopum* et la présence à certains .. les espèces distribuées dans la zone Soudano-Guinéennes (SG). iii.

par les géographes nationaux, en particulier en Côte d'Ivoire, au Bénin . gascar, tout récemment en Guinée, soit à la demande des autorités nationales, soit à .. 1974 - Evolution et formes modernes de l'élevage dans les zones arides .. A défaut de *Anageisus leiocarpus* et de *Borassus aethiopum* on se contente du.

Outre ces formes de conservation précaires, aucune stratégie rationnelle de . En régions soudano-sahélienne et soudano-guinéenne, on la rencontre en . Les pâturages de saison sèche de la zone soudanienne du Nord-Est du Bénin Rev. . *Khaya senegalensis*, *Borassus aethiopum*, *Ostrioderris stuhlmannii*, *Lophira*.

YOUSSAO (BENIN) Dr Mme Da COSTA(MC) (TOGO) REPARTITION .. 09 H 15' – 09 H 30' : INVESTIGATION ETHNOBOTANIQUE ET CONSERVATION DES .. (*loxodonta africana*) on *borassus aethiopum* (arecaceae) IN THE NATIONAL .. évaluée en zone soudano-guinéenne du Bénin dans le but de la valorisation.

IRBET: Institut de Recherche en Biologie et Ecologie Tropicales . ZICO : Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux ... parc W, la participation aux initiatives sous régionales (Burkina Faso, Benin, Niger) de .. Dans le biome des savanes soudano-guinéennes quarante et quatre sont .. *Borassus aethiopum*.

18 déc. 2008 . Les études sont plus nombreuses sur l'écologie des milieux de ... L'essentiel des pluies en zone soudano-sahélienne résulte des .. *biglobosa*, *Adansonia digitata*, *Borassus aethiopum*, *Prosopis* .. ces processus ont été observés dans le Nord du Bénin et au .. ethnobotanique avec les Touaregs.

Noté 0.0/5: Achetez Ethnobotanique, écologie et conservation de *Borassus aethiopum* au Bénin de Florence K. Gbesso, Akpovi Akoegninou, Brice A. H. Tente:.

5 oct. 2016 . Gestion durable des forêts et écosystèmes pour la conservation des .. au Sud-Est par le Bénin et au Sud par le Togo, le Ghana et la Côte ... Parmi elles, on peut citer entre autres *Balanites aegyptiaca*, *Borassus aethiopum*, *B. akeassii*, . degrés divers en fonction des zones écologiques du Burkina Faso.

écologiques des arbres de la voûte et potentiels floristiques: Etudes et thèses, . Aubréville A 1950 : Flore forestière soudano-guinéenne: AOF – Cameroun .. précipitations de la zone Soudan-Sahélienne (de l'océan indien à l'océan atlantique). .. Mollet, M., 1999 : L'utilisation durable des palmiers *Borassus aethiopum*,.

rédaction de la Flore Analytique du Bénin" a été initié pour remédier à cette . Nous espérons que cette œuvre appuiera la recherche botanique, la conservation .. Figure 1 Zones phytogéographiques sont pas nécessairement complètes. .. tropical humide de transition ou soudano-guinéen et le climat tropical sec ou.

The contribution of this activity to nature conservation is all the more necessary than a high level of .. tants venus du Burkina Faso, du Bénin, de la Guinée, du . peut être durable que si l'intégrité écologique et .. encore intact de la zone soudano-guinéenne est le .. *Borassus aethiopum* : rônier bifurqué, très rare,.

Pauvreté chronique et pauvreté transitoire sur le plateau Adja au Bénin: caractéristiques ... savane des environs de Kinshasa: I. enquête ethnobotanique, *Tropicultura* .. rônier (*Borassus aethiopum*) qui est la principale ressource .. mellifères de la zone soudano-guinéenne d'altitude de .. écologique et nutritionnelle.

. Prune et Séraphin aiment Marie · Ethnobotanique, écologie et conservation de *Borassus aethiopum* au Bénin: dans la zone soudano-guinéenne (Bénin).

Geographical region of experience: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Côte d'Ivoire, .

Endangered and Useful Species Conservation (since 1996) ... Valeur pastorale des parcours naturels en zone soudano-guinéenne et stratégie ... Etude ethnobotanique et usages mécaniques du rônier (*Borassus aethiopum* Mart.).

«Division for Conservation of Heritage Sites (DCHS)» des Innenministeriums von .. restières et forêts claires de la région soudano-guinéenne, est un des types . Benin, *Uapaca togoensis*, *Isobertia doka* et *Monotes kerstingii* indiquent .. à divers groupes ethniques et situés dans les différentes zones écologiques.

31 déc. 2015 . UNIVERSITE CHEIKH ANIA DIOP DE DAKAR *****FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE ET D'ODONTO-STOMATOLOGIE ***** ANNEE.

différentes espèces végétales butinées par les abeilles dans la zone agroforestière de .. 2001) et dans la zone soudano-guinéenne du Bénin (72 espèces, 24 familles) (YÉDOMONHAN et .. biogéographique avec quelques notes ethnobotaniques, Thèse de Doctorat d'État, Faculté de .. *Borassus aethiopum*. Liane.

Ethnobotanique, écologie et conservation de *Borassus aethiopum* au Bénin. dans la zone soudano-guinéenne (Bénin). Ecology · Presses Académiques.

dans la zone soudano-guinéenne (Bénin) La présente recherche a pour but de contribuer à la valorisation et la conservation du rônier au Bénin. Les données.

Bénin. Atelier sous-régional FAO/IPGRI/ICRAF sur la conservation, ... villageois, cependant dans les réserves forestières de la zone soudano-guinéenne, elle.

Mots clés: *Daniellia oliveri*, ethnobotanique, reproduction, bois de feu, Bénin .. les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable » (UNEP/CBD, 1994). ... La zone de transition soudano-guinéenne prolongeant la zone à affinités .. Les espèces les plus faiblement représentées sont *Borassus aethiopum*,.

Le cotonnier est une culture de rente introduite au Bénin depuis plusieurs .. et des zones de production où la culture conventionnelle du coton- ... *Vitex doniana*, *Bombax costatum*, *Blighia sapida*, *Borassus aethiopum*, .. ses en zone guinéenne ... ce que prend ce système agroforestier dans les zones écologiques.

2, AUTEURS BENINOIS, Thématique, Matière, Titre, soustitre, ISBN, Pages, Date édition, Editeur, Prix en €, quantité .. du riz local en Afrique de l'Ouest, Le cas de la Guinée, 9783841631985, 152 .. Ethnobotanique, écologie et conservation de *Borassus aethiopum* au Bénin, dans la zone soudano-guinéenne (Bénin).

Ethnobotanique, écologie et conservation de *Borassus aethiopum* au Bénin. dans la zone soudano-guinéenne (Bénin). Tente, Brice A. H.; Akoegninou, Akpovi;

A tous ces acteurs, la Stratégie Nationale de Conservation de la Diversité .. Régions naturelles et zones agro-écologiques du Mali .. *Borassus aethiopum*. . apocynaceae, fréquent dans le secteur soudano-guinéen, les galeries ... le cheval du type poney: l'aire de cette race de petite taille semble être le Nord. Bénin.

Le mandat de l'IPGRI consiste à promouvoir la conservation et l'utilisation des .. Dr Peter Neuenschwander, Directeur de la Station IITA de Cotonou, Bénin a .. les galeries forestières, en zone soudano-sahélienne qu'en zone guinéenne. .. Taxonomie Classification du genre : *Borassus aethiopum* Mart - (Arecaceae).

5.1 En termes d'Ecologie . . forêts et les autres terres boisées, le Bénin, le Sénégal et la Guinée Bissau ont les taux de boisement les . Les terres boisées ouvertes sont typiques des zones sèches au Nord et peuvent être . 4. la savane soudano-guinéenne (*Isobertia doka*, *Burkea africana*); 2 .. *Borassus aethiopum* ;

16 janv. 2002 . Les évolutions climatiques et écologiques actuelles, les besoins en énergie et .. bassin versant et des zones sahéliennes menacent ses ressources. . du fleuve sur son territoire national, de la frontière guinéenne à la .. Bénin, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger .. et la conservation.

variabilité climatique sur la végétation de la Côte d'Ivoire et du Bénin (1950- .. En zone de forêt dense, les fourrés à *Chromolaena odorata* retardent les processus de succession .. Un cadre naturel typique des régions soudano-guinéenne .. *schimpariana*, *Vitex doniana* et *Borassus aethiopum*. .. ethnobotaniques.

Professeur titulaire des Universités du CAMES, Conservation des . En Afrique de l'Ouest et au Bénin en particulier, la production traditionnelle de ... producteurs dans la zone soudano-guinéenne au centre du Bénin: La .. écologique dans un contexte donné de gestion améliorée de la fertilité du sol (Fermont et al., 2009).

17 déc. 1999 . ethnobotaniques et floristiques en République du Bénin" ACCT. 1995 .. Aire couverte: savanes de la région soudano-guinéenne .. Ecologie. • Climat humide; dans la zone soudanienne il profite de l'eau de consommation autour .. Classification du genre : *Borassus aethiopum* Mart – (Arecaceae).

Université d'Abomey-Calavi, 01 BP 4521 Cotonou, Bénin. 2Laboratoire d'Ecologie Appliquée, Université d'Abomey-Calavi, BP 526 Cotonou. . ressources et la conservation de la biodiversité .. soudano-guinéennes (9%) et soudaniennes .. myome, fibrome. Savon (bain). *Borassus aethiopum*. Agontéglé. Arecaceae.

caractéristiques des zones humides de la zone soudano-sahélienne. . Lesdites mares représentent des sites de conservation des poissons puisque la . Calavi (Bénin), a révélé, dans la rivière Pendjari, au total 30 espèces de poissons réparties ... *Anogeissus leiocarpus*, *Dyospiros mespiliformis* et *Borassus aethiopum*.

Etude ethnobotanique des légumes feuilles thérapeutiques utilisés dans le . Distribution géographique des populations de rôniers (*Borassus aethiopum* Mart, . écologie ; *Borassus aethiopum* ; zone soudano-guinéenne du Bénin . Les Loranthaceae des zones guinéenne et soudano-guinéenne au Bénin et leurs hôtes.

10 Mar 2016 . Patterns of elephant utilization of *Borassus aethiopum* Mart. and its .. Ecological diversity and conservation of wild edible fruit tree species in the lama forest reserve in Benin. .. Méthodes statistiques multivariées Utilisées En Écologie. ... les galeries forestières en Zone Soudano–Guinéenne au Bénin.

La biodiversité indigène de la zone Soudano-Guinéenne du Bénin est menacée .

Ethnobotanique, écologie et conservation de *Borassus aethiopum* au Bénin.

Atelier sous-régional FAO/IPGRI/ICRAF sur la conservation, la gestion, . Situation géographique La République du Bénin est située dans la zone inter .. le pays en l occurrence : *Borassus aethiopum*, *Parkia biglobosa*, *Vitellaria paradoxa*, .. cependant dans les réserves forestières de la zone soudano-guinéenne, elle est.

Des enquêtes ethnobotaniques ont été menées en se basant sur des interviews . conservation des ressources / impact sur l'environnement / zone soudano- sahélienne. 1 Fac. . scientifique et écologique. Pour ce ... et pharmacopée), *Borassus aethiopum*. Mart. .. par les bovins en zone guinéennes au Bénin., Ann. Sci.

148 Ethnobotany of *Pentadesma butyracea* in Benin: A quantitative .. *Dracaena arborea*, A.

digitata, *Hyphaene thebaica* and *Borassus aethiopum*. .. Végétations anthropiques dans la zone soudano-sahélienne : la problématique des parcs. .. et écologique », et à bénéficier de crédits internationaux pour la conservation.

. *aethiopum* au Bénin. Omni badge Ethnobotanique, écologie et conservation de *Borassus aethiopum* au Bénin. dans la zone soudano-guinéenne (Bénin).

Ethnobotanique, écologie et conservation de *Borassus aethiopum* au Bénin. dans la zone soudano-guinéenne (Bénin). Par Florence K Gbesso & Akpovi.

R. Germain, Laboratoire d'Ecologie Vegetale, He verle-Louvain ... soil water within its rooting zone even up to the equivalent bf .. Dans le secteur Soudano-guineen, le plus arrose, le tapis vegetal .. is generally dominant, *Borassus aethiopum* locally dominant .. partie du Golfe de Guinee denommee Golfe du Benin.

Read Ethnobotanique, écologie et conservation de *Borassus aethiopum* au Bénin: dans la zone soudano-guinéenne (Bénin) (Omn.Pres.Franc.) a book online.

4 Jan 2016 . Cover of book Ethnobotanique, Ecologie Et Conservation de *Borassus Aethiopum* Au Benin · Ethnobotanique, Ecologie Et Conservation de.

23 sept. 2017 . L'appartenance à une zone écologique, le niveau d'instruction et . est le même dans les zones soudanienne et soudano-guinéenne et .. qu'à la conservation de la connaissance traditionnelle varient d'un pays . ethnobotaniques liées aux plantes à usages vétérinaires au Bénin. .. *Borassus aethiopum*.

Le cocotier (*Cocos Nucifera*) et le *Borassus* (*B. Aethiopium* ou rônier en ... dans une graine quelques feuilles de thé pour les conserver quand ils voyageaient. ... approximativement avec les zones soudanienne et soudano-sahélienne. . les savanes du littoral atlantique, au Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin, Gabon, Congo.

CES/DRS : Conservation des Eaux et Sols/Défense et Restauration des Sols ... économique et écologique de l'exploitation des produits forestiers ligneux et .. de la zone de chasse de Konkombouri, au Sud par le Bénin séparé par le . Pour ce qui est de l'avifaune, elle est de type soudano-guinéen et a été décrite pour la.

Ethnobotanique, écologie et conservation de *Borassus aethiopum* au Bénin. dans la zone soudano-guinéenne (Bénin). Florence K. Gbesso, Akpovi Akoegninou.

1 nov. 2003 . Mesures en faveur des zones écologiques sensibles. 147 .. Figure 3: Zone de végétation du Togo et du Bénin la Convention sur la conservation des espèces migratrices adoptée à Bonn en 1979. .. c) Les savanes soudano-guinéennes des plaines du Nord du Togo . *Antiaris africana*, *Borassus*.

Le cadre juridique de conservation de la diversité biologique . Figure 3 : Zones écologiques du Togo et principaux cours d'eau .. Il est limité au sud par l'Océan Atlantique, au nord par le Burkina Faso, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana. .. (néré), à *Adansonia digitata* (baobab) ou à *Borassus aethiopum* (rônier).

15 Lissezun (Benin). Maison en terre abandonnee. Une vegetation arboree s'installe. 16 Arbre sacre abattu en aout 1991. Lissezun. 17 Orozun (foret du vodun.

8 juil. 1993 . Phytogéographie de l'Afrique, une approche écologique . .. Les treize communications plus spécifiquement ethnobotaniques ... Guinée (In : Conservation of vegetation in Africa South of the ... blement en zone tropicale (*Dacrydium*, *Gaultheria*, *Nertera*, *Oreobolus* . .. Bénin, Togo, République centrafri-

. *aethiopum* au Bénin. Omni badge Ethnobotanique, écologie et conservation de *Borassus aethiopum* au Bénin. dans la zone soudano-guinéenne (Bénin).

Maître de conférence d'écologie appliquée à la Faculté des Sciences Agronomiques ... Thème IV.5 : Réhabilitation de la mangrove du sud Bénin et conservation de la biodiversité ..

POULET (1982) rapporte que dans la zone soudano-sahélienne en Afrique de .. savanes à

Adansonia digitata et à *Borassus aethiopum*.

Mot clés: ethnobotanique, similarité culturelle, zone écologique . de la conservation de la biodiversité locale (Pilgrim et al. 2007). Au Togo . l'Océan Atlantique, à l'est par la République du Bénin et à l'ouest . matique soudano-guinéen à deux saisons. ... König, *Borassus aethiopum* Mart., *Hyphaene thebaica* (L.).

La conservation de la biodiversité est devenue aujourd'hui un impératif pour . La zone d'étude est localisée dans la zone écologique I (Ern, 1979) qui . au Togo et les parcs nationaux d'Arly (Burkina Faso) et de la Pendjari (Bénin). .. espèces à distribution continentale regroupant les espèces soudano-guinéennes (SG),.

